



Annexe 1

Lexique



Agence de gestion intégrée des ressources

1030, boul. Vézina - Dolbeau-Mistassini - Québec - G8L 3K9

Tél: 418-276-0022 poste 111 - Téléc: 418-276-0623 - Courriel: agir@cldmaria.qc.ca

Lexique

Âge d'exploitabilité

Âge d'un peuplement régulier au moment de la récolte tel que fixé par l'aménagement.

Allopatrique

Lac possédant une seule espèce de poisson.

Aulnaie

Peuplement d'aulnes.

Bétulaie

Peuplement de bouleaux.

Bog

Tourbière alimentée exclusivement d'eaux de précipitations.

CAAF (contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier)

Entente contractuelle conclue par le gouvernement et le titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de transformation de bois en vue de l'aménagement de l'aire forestière où l'industriel est autorisé à récolter un certain volume de bois pour approvisionner son usine.

Canard barboteur

Canard se nourrissant à la surface de l'eau, en barbotant. Ils sont souvent végétariens.

Canard plongeur

Canard qui plonge en profondeur pour se nourrir. Ils se nourrissent de poissons, de crustacés, de mollusques et de plantes.

Cédrière

Peuplement de cèdres.

Coupe avec protection de la régénération

Coupe qui consiste à protéger la régénération préétablie lors des travaux de récolte.

Coupe de jardinage

La première intervention d'une coupe progressive; elle est réalisée avant l'atteinte de l'âge d'exploitabilité, de façon à augmenter l'ouverture permanente du couvert afin de créer des conditions favorables à la régénération naturelle par les arbres conservés comme semenciers, tout en limitant le développement de la végétation concurrente du sous-bois.

Coupe mosaïque

Coupe avec protection de la régénération et des sols effectuée de façon à conserver entre deux aires de coupe une forêt d'une superficie au moins équivalente à la superficie du peuplement récolté.

Coupe totale

Coupe de la totalité des arbres marchands d'un peuplement.

Cyprin (CY)

Poisson de petite taille (mené) de la famille de la carpe. Ce type de poisson a longtemps été utilisé comme poisson-appât et introduit dans de nombreux lacs où il compétitionne l'omble de fontaine.

Dépôt de surface

Couche meuble de matériaux minéraux ou organiques qui repose sur le socle rocheux.

Développement durable ou écodéveloppement

Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs. Le développement durable vise à satisfaire les besoins fondamentaux de tous et à fournir à chacun la possibilité de vivre une vie meilleure selon ses aspirations. Plutôt qu'un état d'harmonie immuable, c'est un processus évolutif dans lequel l'exploitation des ressources et leur renouvellement, l'orientation des investissements, le sens du progrès technologique et l'évolution des institutions tiennent compte des besoins futurs autant que des besoins présents.

Éclaircie commerciale

Récolte d'arbres de dimensions commerciales, de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité supérieure, d'un peuplement forestier en âge de réagir positivement.

Éclaircie précommerciale

Coupe pratiquée dans un peuplement forestier immature, destiné à favoriser l'espacement entre les arbres et à accélérer leur accroissement en diamètre.

Écotone

Zone de transition entre deux milieux, deux peuplements.

Encadrement visuel

Voir *Paysage visible*.

Équivalent-couple

Variable permettant d'identifier la présence d'un couple considéré comme nicheur, c'est-à-dire l'observation d'un ou deux individus de la même espèce.

Érablière

Peuplement d'érables.

Fen

Tourbière principalement parcourue d'eaux venues d'abord en contact avec un sol minéral.

GIR (Gestion intégrée des ressources)

Mode de gestion qui vise à améliorer la conservation et la mise en valeur des multiples ressources du milieu forestier, au profit de l'ensemble de la société, en amenant tous les utilisateurs à participer à la planification et la réalisation des activités d'aménagement de ces ressources.

IDF (indice de diversité forestière)

Indice, gradué de 0 à 1, servant à mesurer la diversité des âges des peuplements d'un territoire.

IQH (indice de qualité d'habitat)

Indice, gradué de 0 à 1, mesurant la qualité de l'habitat pour certaines espèces représentatives d'un milieu particulier.

Mélèzaie

Peuplement de mélèzes.

Meunier (ME)

Poisson à bouche ventrale autrefois utilisé comme poisson-appât et introduit dans de nombreux lacs. Il y a deux espèces de meunier dans nos régions, le meunier noir et le meunier rouge. Ce sont de très gros compétiteurs de l'omble de fontaine.

Mycorhizien

Champignon s'associant par symbiose (association bénéfique aux deux espèces) aux racines de certains arbres.

OQV (objectif de qualité visuelle)

Niveau de protection du paysage à atteindre selon l'importance socio-économique du site ou du réseau.

Parcelle

Subdivision d'une unité d'aménagement qui permet de situer, de décrire et d'enregistrer les caractéristiques biophysiques du milieu et qui sert de base à l'aménagement forestier.

Paysage visible ou encadrement visuel

Environnement autour de certaines unités territoriales, depuis le site jusqu'à une distance de 1,5 kilomètres.

Pessière

Peuplement d'épinettes.

Peupleraie

Peuplement de peupliers.

Pinède

Peuplement de pins.

Possibilité de récolte annuelle

Quantité maximale de matière ligneuse pouvant être extraite d'une forêt annuellement et perpétuellement.

Regarni

Réfection des plantations là où le reboisement, naturel ou artificiel, n'a pas permis d'atteindre une densité adéquate. Désigne aussi un endroit où ces plantations sont faites ainsi que les plants destinés à combler les vides d'un reboisement.

Régime hydrique

Capacité du sol à fournir de l'eau aux plantes tout au long de la saison de croissance.

Rendement accru

Rendement visant à utiliser pleinement le potentiel des terrains forestiers en y pratiquant une sylviculture intensive sur les meilleurs sols forestiers, le reboisement des surfaces non ou mal régénérées, l'augmentation de la superficie forestière productive et l'utilisation plus complète de l'arbre.

Rendement soutenu

Rendement qu'une forêt peut produire en permanence selon une intensité d'aménagement donnée.

RNI (Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public)

Les titulaires de permis d'intervention sont tenus de se conformer aux normes d'intervention forestière applicables à leurs activités d'aménagement forestier. Ces normes ont pour objet d'assurer : le maintien ou la reconstitution du couvert forestier, la protection de l'ensemble des ressources du milieu forestier et la compatibilité des activités d'aménagement forestier avec l'affectation des terres du domaine public.

Sapinière

Peuplement de sapins.

Sauvagine forestière

Canards nichant dans des cavités situées dans des arbres.

SIFA (Système d'information sur la faune aquatique)

Base de données de la Société de la faune et des parcs du Québec colligeant l'information disponible sur la faune aquatique et les plans d'eau du Québec.

Territoire forestier productif

Territoire forestier produisant au moins 30 m³ de bois par hectare sur une période de 120 ans. Les milieux non productifs sont généralement les tourbières (dénudé humide), les aulnaies et les dénudés secs.

Traficabilité

Évaluation de la possibilité du sol pour la circulation de la machinerie forestière, selon trois critères : la solidité, la rugosité et la pente.

UGAF (Unité de gestion des animaux à fourrure)

Division relativement homogène du territoire qui tient compte autant de l'habitat que de la distribution et de l'abondance des espèces fauniques. Ces divisions permettent une meilleure gestion des animaux à fourrure.